

**ИНСТРУКЦИЯ**  
**ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ПРЕПАРАТА**  
**ЛЕГАЛОН® 140**

**Регистрационный номер:**

**Торговое название:** Легалон® 140

**Международное непатентованное или группировочное название:**

Расторопши пятнистой плодов экстракт&

**Лекарственная форма:** капсулы.

**Состав:**

Одна капсула содержит:

*Активное вещество:* расторопши пятнистой плодов экстракт сухой (36-44:1) – 173,0-186,7 мг, эквивалентно 140 мг силимарина (ДНФГ), эквивалентно 108,2 мг силимарина (ВЭЖХ/Герм.Ф.) в расчете на силибинин.

*Вспомогательные вещества:* полисорбат 80, повидон, маннитол, карбоксиметилкрахмал натрия (тип А), магния стеарат.

*Оболочка* твердая желатиновая капсула, размер «1», в состав которой входит: желатин, краситель железа оксид красный (E172), титана диоксид (E171), натрия лаурилсульфат, краситель железа оксид черный (E172).

**Описание:**


*Внешний вид капсулы:* твердые желатиновые капсулы, размер «1», корпус и крышечка коричневого цвета. *Внешний вид содержимого капсулы:* порошок желтого цвета.

**Фармакотерапевтическая группа:** гепатопротекторное средство.

Код АТХ: А05ВА03.

**ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА**

Взаимодействует со свободными радикалами в печени и переводит их в менее токсичные соединения, прерывая процесс перекисного окисления липидов, препятствует разрушению клеточных структур. В поврежденных гепатоцитах стимулирует синтез структурных и функциональных белков и фосфолипидов (за счет специфической



стимуляции РНК-полимеразы А), стабилизирует клеточные мембраны, предотвращает потерю компонентов клетки (трансаминаз), ускоряет регенерацию клеток печени. Тормозит проникновение в клетку некоторых гепатотоксичных веществ.

*Фармакокинетика.* Абсорбция – низкая и медленная (период полуабсорбции – 2,2 ч), метаболизируется в печени путем конъюгации, период полувыведения – 6 ч. Выводится преимущественно с желчью в форме глюкуронидов и сульфатов. Не кумулирует в организме. Отмечается кишечно-печеночная циркуляция.

#### **ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ**

Токсические поражения печени (алкоголизм; интоксикация галогенсодержащими углеводородами, соединениями тяжелых металлов; лекарственные поражения печени) и их профилактика.

#### **ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ**

Повышенная чувствительность к компонентам препарата.

#### **ПРИМЕНЕНИЕ В ПЕРИОД БЕРЕМЕННОСТИ И ГРУДНОГО ВСКАРМЛИВАНИЯ**

Не рекомендуется применять препарат во время беременности и грудного вскармливания.

#### **ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИМИ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ СРЕДСТВАМИ**

Не описано.

#### **СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И ДОЗЫ**

Внутрь, после еды, запивая небольшим количеством воды. По 1 капсуле 3 раза в день.

Поддерживающая доза – по 1 капсуле 2 раза в день.

#### **ПОБОЧНОЕ ДЕЙСТВИЕ**

Аллергические реакции, редко – послабляющее действие.

#### **ФОРМА ВЫПУСКА**

Капсулы 140 мг. По 10 капсул в блистере из пленки ПВХ-алюминиевой фольги. 2, 3 или 6 блистеров в картонной пачке вместе с инструкцией по применению.



**УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ**

В защищенном от света месте, при температуре не выше 30 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

**СРОК ГОДНОСТИ**

5 лет.

Не применять по истечении срока годности, указанного на упаковке.

**УСЛОВИЯ ОТПУСКА ИЗ АПТЕК**

Без рецепта.

**ПРОИЗВОДИТЕЛЬ**

МАДАУС ГмбХ, 51109 Кёльн, Германия

Телефон: +49 221 8998-0

Факс: +49 221 8998-701

**Претензии потребителей по качеству препарата принимает:**

Московское представительство фирмы „Роттафарм С.П.А.“,

117321, Москва, ул. Островитянова, 14, офис 208.

Тел: (495) 933-67-94, факс: (495) 937-85-01.

Глава Московского представительства  
фирмы «Роттафарм С.П.А.» (Италия)



Н.С.Ягья

Директор ИДКЭЛС



Н.Васильев