

ИНСТРУКЦИЯ
ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ПРЕПАРАТА
ЛЕГАЛОН® 70

Регистрационный номер:

Торговое название: Легалон® 70

Международное непатентованное или группировочное название:

Расторопши пятнистой плодов экстракт&

Лекарственная форма: капсулы.

Состав:

Одна капсула содержит:

Активное вещество: расторопши пятнистой плодов экстракт сухой (36-44:1) - 86,5-93,35 мг, эквивалентно 70 мг силимарина (ДНФГ), эквивалентно 54,1 мг силимарина (ВЭЖХ/Герм.Ф.) в расчете на силибинин.

Вспомогательные вещества: полисорбат 80, повидон, маннитол, карбоксиметилкрахмал натрия (тип А), магния стеарат.

Оболочка: твердая желатиновая капсула, размер «2», в состав которой входит: желатин, краситель железа оксид красный (E172), титана диоксид (E171), натрия лаурилсульфат, краситель железа оксид черный (E172).

Описание:

Внешний вид капсулы: твердые желатиновые капсулы, размер «2», корпус и крышечка коричневого цвета. *Внешний вид содержимого капсулы:* порошок желтого цвета.

Фармакотерапевтическая группа: гепатопротекторное средство.

Код АТХ: А05ВА03.

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Взаимодействует со свободными радикалами в печени и переводит их в менее токсичные соединения, прерывая процесс перекисного окисления липидов, препятствует разрушению клеточных структур. В поврежденных гепатоцитах стимулирует синтез структурных и функциональных белков и фосфолипидов (за счет специфической



стимуляции РНК-полимеразы А), стабилизирует клеточные мембраны, предотвращает потерю компонентов клетки (трансаминаз), ускоряет регенерацию клеток печени. Тормозит проникновение в клетку некоторых гепатотоксичных веществ.

Фармакокинетика. Абсорбция – низкая и медленная (период полуабсорбции – 2,2 ч), метаболизируется в печени путем конъюгации, период полувыведения – 6 ч. Выводится преимущественно с желчью в форме глюкуронидов и сульфатов. Не кумулирует в организме. Отмечается кишечно-печеночная циркуляция.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Токсические поражения печени (алкоголизм; интоксикация галогенсодержащими углеводородами, соединениями тяжелых металлов; лекарственные поражения печени) и их профилактика.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Повышенная чувствительность к компонентам препарата.

ПРИМЕНЕНИЕ В ПЕРИОД БЕРЕМЕННОСТИ И ГРУДНОГО ВСКАРМЛИВАНИЯ

Не рекомендуется применять препарат во время беременности и грудного вскармливания.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИМИ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ СРЕДСТВАМИ

Не описано.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И ДОЗЫ

Внутри, после еды, запивая небольшим количеством воды. По 2 капсулы 3 раза в день.


Поддерживающая доза – по 1 капсуле 3 раза в день.

ПОБОЧНОЕ ДЕЙСТВИЕ

Аллергические реакции, редко – послабляющее действие.

ФОРМА ВЫПУСКА

Капсулы 70 мг. По 10 капсул в блистере из пленки ПВХ-алюминиевой фольги. 2, 3 или 6 блистеров в картонной пачке вместе с инструкцией по применению.



УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

В защищенном от света месте, при температуре не выше 30 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

СРОК ГОДНОСТИ

5 лет.

Не применять по истечении срока годности, указанного на упаковке.

УСЛОВИЯ ОТПУСКА ИЗ АПТЕК

Без рецепта.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

МАДАУС ГмбХ, 51109 Кёльн, Германия

Телефон: +49 221 8998-0

Факс: +49 221 8998-701


Претензии потребителей по качеству препарата принимает:

Московское представительство фирмы „Роттафарм С.П.А.”,

117321, Москва, ул. Островитянова, 14, офис 208.

Тел: (495) 933-67-94, факс: (495) 937-85-01.

Глава Московского представительства
фирмы «Роттафарм С.П.А.» (Италия)



Н.С.Ягья

Директор ИДКЭЛС



А.Н.Васильев